



AQ10[®] WG

Verpakkingsinhoud : 30 gram

AQ10[®] WG

BIOGARD[®]
Division of CBC (Europe)

Verpakkingsinhoud : 30 gram

Toelatingsnummer: 14294 N

BEWAARVOORSCHRIFT

AQ10[®] bewaren op 5°C op een droge, koele plaats, in de originele verpakking, goed gesloten, buiten bereik van kinderen.

Toelatinghouder

CBC (Europe) S.r.l.
Via Majorana 2
20834 NOVA MILANESE (MB)
Italië
(+39) 0362 - 365079

Distributeur:

HortiPro BV
Jagerserf 49
3851 SM ERMELO
Nederland

Technische informatie:

(+31) 341 268639

Bij calamiteiten:

(+31) 341 268639

AQ10[®] is een biologisch contactfungicide welke levende sporen bevat van de schimmel *Ampelomyces quisqualis*, een specifieke antagonist van echte meeldauw. *Ampelomyces quisqualis* is een micro-organisme dat vrij in de natuur voorkomt en niet genetisch gemanipuleerd is. Na toepassing van AQ10[®] gaan de sporen van *Ampelomyces quisqualis* kiemen en het mycelium van de echte meeldauw penetreren en parasiteren. Micro-organismen kunnen mogelijk gevoelige reacties veroorzaken.

SAMENSTELLING:

Werkzame stof.....Gehalte
Ampelomyces quisqualis stam AQ10.....5,0 x 10⁸ KVE/g

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het is uitsluitend toegestaan voor gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een gewasbehandeling in:

1. de bedekte teelt van aardbei;
2. de bedekte teelt van komkommer, tomaat en paprika;

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

VOORZORGSMATREGELEN:

- P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
- P284 Adembescherming dragen.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



TOEPASSINGEN

1. Bedekte teelt van aardbei ter bestrijding van echte meeldauw.

Het is noodzakelijk om AQ10[®] te gebruiken in ten minste 2 opeenvolgende behandelingen met een interval van 7 - 10 dagen. Deze opeenvolgende toepassingen geven AQ10[®] de mogelijkheid om voldoende populatie op te bouwen voor een langdurig efficiënte bestrijding.

AQ10[®] kan preventief toegepast worden met een lage dosis tijdens de periodes met een verhoogd risico op echte meeldauw. En als curatieve behandeling met een hoge dosis zodra de eerste ziektebeelden verschijnen op het gewas. (bladaantasting < 3%)

Dosering 35-70 g/ha in 500 tot 1000 liter water.

2. Bedekte teelt van komkommer, tomaat en paprika ter bestrijding van echte meeldauw. Het is noodzakelijk om AQ10[®] te gebruiken in ten minste 2 opeenvolgende behandelingen met een interval van 7 - 10 dagen. Deze opeenvolgende toepassingen geven AQ10[®] de mogelijkheid om voldoende populatie op te bouwen voor een langdurig efficiënte bestrijding. AQ10[®] kan preventief toegepast worden met een lage dosis tijdens de periodes met een verhoogd risico op echte meeldauw. En als curatieve behandeling met een hoge dosis zodra de eerste ziektebeelden verschijnen

op het gewas. (bladaantasting < 3%)
Dosering 35-70 g/ha in 3000 liter water.

AQ10[®] kan toegepast worden met conventionele spuitapparatuur. Gebruik voldoende water om een volledige bedekking te verzekeren.

Het optimale tijdstip voor behandeling is in de vroege morgen of laat in de avond, wanneer de relatieve luchtvochtigheid het hoogst is. Deze omstandigheden verzekeren een maximale kieming van de sporen.

BEREIDING VAN DE SPUITOPLOSSING

AQ10[®] goed mengen met water. Vul de tank voor de helft met water, voeg de benodigde hoeveelheid AQ10[®] toe in de tank, vervolgens de tank aanvullen met water.

AQ10[®] indien mogelijk altijd in combinatie gebruiken met een uitvloeier. Voortdurend de tank roeren om de spuitvloeistof in suspensie te houden. De volledige tankinhoud dezelfde dag gebruiken. De levensvatbaarheid van de AQ10[®] sporen in het water neemt af na 12 uur.

SCHOONMAKEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Spuut de tank goed schoon. Laat de leidingen en nozzels minimaal twee keer goed doorlopen met schoon water direct na de bespuiting.

VERENIGBAARHEID MET ANDERE MIDDELEN

AQ10[®] is een biologische fungicide en kan beïnvloed worden door residu van andere middelen. Voor advies met verenigbaarheid met andere middelen, consulteer de distributeur.

Vermeng AQ10[®] niet met enig andere pesticide of geconcentreerde meststof zonder de distributeur hierover vooraf te consulteren.

AQ10[®] is gebruikt op een breed scala van gewassen in diverse omstandigheden. Hierbij is geen fytotoxiciteit vastgesteld.

RESISTENTIE

Er is geen geval bekend van resistentie voor AQ10[®]. Het is echter raadzaam middelen tegen echte meeldauw van tijd tot tijd af te wisselen, vooral bij opeenvolgende gewassen.

GARANTIE

De verkoper geeft geen garantie, expliciet noch impliciet, op het gebruik van het middel, anders dan op het label vermeldt staat. De koper en gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik, toepassing en opslag van het product, in overeenkomst met de aanwijzingen die op het label zijn vermeldt.